

**MYTHIC® GEL**

Esca in gel pronta all'uso  
per il controllo degli scarafaggi  
**PER USO PROFESSIONALE**

**MYTHIC® GEL****Composizione:**

100 g di prodotto contengono:  
Chlorfenapyr puro 0,4 g  
Coformulanti q. b. a 100 g

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A.**

Via Marconato, 8 - 20831 Cesano Maderno (MB)  
Tel. 0362/512.1

**Presidio Medico Chirurgico**

**Registrazione del Ministero della Salute n. 20020**

**Officina di produzione:**

FormiChem GmbH, Anna-von-Philipp-Str. B33, 86633  
Neuburg a.d. Donau Germany.

**Contenuto netto:** cartucce da 30 g/cad.

120 g (4 x 30 g) e 600 g (5 x 4 x 30 g)

**Validità: 2 anni**

**Lotto n.** del

© Marchio registrato

**NORME PRECAUZIONALI**

In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, rimuovere con molta acqua anche sotto le palpebre per almeno 15 minuti. Se sintomi persistono, consultare un medico. Se il prodotto viene ingerito, pulire la bocca con acqua e berne molta. Se i sintomi persistono, contattare un medico. **Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Il Chlorfenapyr può provocare irritazione agli occhi, alla pelle, alla mucosa, all'apparato respiratorio e all'apparato gastrointesti-

nale; nausea e vomito; dermatite da contatto e sensibilizzazione.

**Terapia:** sintomatica

**Consultare un Centro Antiveneni.**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Mythic® Gel** è un'esca pronta in gel per il controllo degli scarafaggi: blattella germanica (*Blattella germanica*), blatta orientale (*Blatta orientalis*), blatta americana (*Periplaneta americana*) ed altre specie di blatte che possono essere presenti, sia sugli stadi preimmaginali sia su quelli adulti.

Può essere usato, per il controllo delle blatte in :

- locali domestici (cucine incluse);
- aree di manipolazione degli alimenti (lavorazione, conservazione e preparazione dei cibi) come ad esempio in locali adibiti al confezionamento di cibi, cucine professionali, ristoranti, locali di conservazione dei cibi, magazzini, negozi di alimentari al dettaglio, etc.;
- locali pubblici quali alberghi, ospedali, prigioni, teatri ; locali commerciali ed industriali come stabilimenti, negozi, uffici, velivoli, veicoli, depositi ferroviari, imbarcazioni

**Mythic® Gel** è particolarmente efficace quando è posto all'interno o nelle vicinanze dei rifugi e delle zone frequentate dalle blatte. Queste zone, generalmente sono buie e calde, umide e tranquille come ad esempio il retro di frigoriferi e di apparecchi elettrici. Localizzate queste aree con tecniche appropriate quali ispezioni o trappole. Per conseguire i migliori risultati, l'area da trattare deve essere pulita prima dell'applicazione, facendo particolare attenzione nel rimuovere fonti alternative di cibo

**Mythic® Gel** va applicato in piccole gocce nelle aree infestate. Le gocce di gel vanno applicate nelle zone buie e nascoste, nelle fessure, nelle crepe, dietro le credenze e le scaffalature, sotto forni e fornelli, all'interno di pannellature elettriche, cavità e condotti, in prossimità dei sanitari, etc. Non applicare il **Mythic® Gel** nei luoghi in cui potrebbe essere dilavato o facilmente rimosso con la pulizia ordinaria. Non spruzzare insetticidi sul **Mythic® Gel** o nell'area circostante, né applicare il prodotto sulle superfici recentemente trattate con insetticidi, in quanto questi, potrebbero scoraggiare le blatte dall'alimentarsi con l'esca. Nel caso in cui siano state contaminate con il **Mythic® Gel** superfici non bersaglio, rimuovetelo con un tovagliolo di carta umido e cestinatelo tra i rifiuti domestici; pulire completamente l'area.

Normalmente le blatte muoiono nell'arco di poche ore dopo una singola assunzione di **Mythic® Gel**. In genere, nelle aree infestate si possono osservare blatte morte nell'arco delle 24 - 48 ore dal trattamento. Le aree trattate vanno ispezionate nuovamente dopo 2 - 3 settimane. Qualora l'infestazione iniziale sia stata massiccia, si rende necessaria una seconda applicazione di **Mythic® Gel** se l'esca del primo trattamento è stata consumata e sono ancora presenti blatte vive.

Le cartucce di **Mythic® Gel** sono state messe a punto per essere utilizzate con l'applicatore "BaitGun®". Bloccate la cartuccia di **Mythic® Gel** nell'applicatore "BaitGun®" e inserite l'apposito beccuccio dosatore. Per l'uso dell'applicatore "BaitGun®" fate riferimento al libretto di istruzioni fornito dal fabbricante.

**DOSI DI APPLICAZIONE:**

Nei casi d'infestazione massiccia o in zone particolarmente sudice o dove fonti alternative di cibo non sono state completamente eliminate, utilizzare dosi maggiorate.

**DOSAGGIO NORMALE :**

Blattella Germanica: una goccia di 0,1 g di gel / m<sup>2</sup>  
Blatta Orientale o Americana: due gocce di 0,1 g di gel/m<sup>2</sup>

**DOSAGGIO MAGGIORATO :**

Blattella Germanica: due gocce di 0,1 g di gel / m<sup>2</sup>  
Blatta Orientale o Americana: tre gocce di 0,1 g di gel/m<sup>2</sup>

Una goccia di 0,1 g è approssimativamente di 4 - 5 mm di diametro.

Conservare le cartucce nell'imballo originale al riparo dalle alte temperature. Una volta esaurita la cartuccia, disfarsene con le dovute precauzioni.

**Non riutilizzare e non ricaricare.**

**CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.**